

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
I. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Igazgató: Prof. Dr. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.; Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 427

Tel.: +36-62-545-189; Fax: +36-62-545-185; E-mail: office.in1st@med.u-szeged.hu

**BELEEGYZŐ NYILATKOZAT AZ EMÉSZTŐRENDSZER FELSŐ SZAKASZÁNAK
ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATÁHOZ**

Beteg neve: **Szül.:**

TAJ szám:

Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján orvosa EUH (endoszkópos ultrahang) elvégzését javasolja. A vizsgálat elmagyarázását, illetve a vizsgálat kockázatának, lehetséges szövődményeinek említését követően kérjük, hogy beleegyezése jeléül írja alá az alábbi nyilatkozatot.

Az EUH egy biztonságos vizsgálat, mely lehetővé teszi a felső gasztrointesztinális traktus (nyelőcső, gyomor, nyombél) falának és a környező szöveteknek (mediastinum, hasnyálmirigy, epeutak, kismedence) ultrahanggal történő nagy felbontású ábrázolását és ez által hasznos információkkal egészíti ki a hasi ultrahang, CT, MRI vizsgálatok eredményét. A vizsgálat során a gyomortükrözésnél használatos endoszkópot (rugalmas cső, melynek végén fényforrás, videokamera és ultrahangfej van) vezetünk a száján keresztül a nyelőcsőbe, gyomorba, majd a nyombélbe. A vizsgálat éhgyomorra történik. A garat lidocainnal történő érzéstelenítését követően intravénás injekcióval felületesen elaltatjuk (annyira éber marad, hogy kooperálni tudjon), hogy segítsük Önt az ellazulásban és minimalizáljuk a vizsgálat okozta kellemetlenséget. A vizsgálat közben vitális paramétereit (szívfrekvencia, oxigénszaturáció) monitorozzuk. A vizsgálatot követően, ha szükséges 1-2 óráig megfigyeljük Önt. Vezetni az altató miatt aznap nem tanácsos; hozzon hozzátartozót magával, hogy hazakísérhesse. Az érzéstelenítő hatásának elmúlását követően (kb. 20 perc) ehet.

A vizsgálat során nagyon ritkán szövődmények léphetnek fel, úgy, mint a bélfal kilyukadása és vérzés, melyek gyakorisága megegyezik a rutin gyomortükrözés során fellépő szövődmények gyakoriságával. Az altatáshoz használt injekció allergiás reakciót okozhat, mely rendszerint enyhe lefolyású és általában csak arra hajlamos egyéneken alakul ki.

Kérjük, informáljon, ha allergiás valamelyik gyógyszerre, műbillentyűje van, korábban endocarditisze volt, vérzékenysége, szív, tüdő, vesebetegsége van, véralvadásgátlót (heparin, Syncumar, Warfarin), vagy trombocita aggregáció gátlót (aspirin, clopidogréll, ticlopidin) szed, és ha Ön terhes.

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A vizsgálattal kapcsolatos kérdéseimre adekvát szóbeli tájékoztatást kaptam. Az EUH vizsgálat elvégzésébe beleegyezem.

Szeged,

.....
beteg aláírása

.....
orvos aláírása

.....
asszisztens aláírása