

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

I. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Igazgató: Prof. Dr. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.; Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 427

Tel.: +36-62-545-189; Fax: +36-62-545-185; E-mail: office.in1st@med.u-szeged.hu

**BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT ENDOSZKÓPOS
ULTRAHANG VÉKONYTŰ ASPIRÁCIÓ VIZSGÁLATHOZ**

Beteg neve: **Szül.:**

TAJ szám:

Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján orvosa endoszkópos ultrahanggal (EUH) történő citológiai mintavétel elvégzését javasolja. A vizsgálat elmagyarázását, illetve a vizsgálat kockázatának, lehetséges szövődményeinek említését követően kérjük, hogy beleegyezése jeléül írja alá az alábbi nyilatkozatot.

Az EUH egy biztonságos vizsgálat, mely lehetővé teszi a gasztrointesztinális traktus (nyelőcső, gyomor, nyombél) falának és a környező szöveteknek (mediastinum, hasnyálmirigy, epeutak, kismedence) ultrahanggal történő nagy felbontású ábrázolását és vékonytűvel az adott szervek betegségeiből sejtek nyerését, mely szövettani diagnózist tesz lehetővé. A vizsgálat során a gyomortükrözésnél használatos endoszkópot (rugalmas cső, melynek végén fényforrás, videokamera és ultrahangfej van) vezetünk a száján keresztül a nyelőcsőbe, gyomorba, majd a nyombélbe. A vizsgálat éhgyomorra történik. A garat lidocainnal történő érzéstelenítését követően intravénás injekcióval felületesen elaltatjuk (annyira éber marad, hogy kooperálni tudjon), hogy segítsük Önt az ellazulásban és minimalizáljuk a vizsgálat okozta kellemetlenséget. A vizsgálat közben vitális paramétereit (szívfrekvencia, oxigénszaturáció) monitorozzuk. A vizsgálat során 0,6 mm vastag tűvel veszünk sejteket a kérdéses szervből. A vizsgálatot követően egy napig megfigyeljük Önt. A vizsgálatot követően aznap nem ehet, infúziót fog kapni.

A vizsgálat során nagyon ritkán szövődmények léphetnek fel, úgy, mint a bélfal kilyukadása és vérzés, melyek gyakorisága megegyezik a rutin gyomortükrözés során fellépő szövődmények gyakoriságával. Az altatáshoz használt injekció allergiás reakciót okozhat, mely rendszerint enyhe lefolyású és általában csak arra hajlamos egyéneken alakul ki.

Kérjük, informáljon, ha allergiás valamelyik gyógyszerre, műbillentyűje van, korábban endocarditisze volt, vérzékenysége, szív, tüdő, vesebetegsége van, véralvadásgátlót (heparin, Syncumar, Warfarin), vagy trombocita aggregáció gátlót (aspirin, clopidogréll, ticlopidin) szed, krónikus fertőző betegsége (AIDS, hepatitis B, C) van, és ha Ön terhes.

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A vizsgálattal kapcsolatos kérdéseimre adekvát szóbeli tájékoztatást kaptam. Az EUH vizsgálat elvégzésébe beleegyezem.

Szeged,

.....
beteg aláírása

.....
orvos aláírása

.....
asszisztens aláírása