

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

I. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

Igazgató: Prof. Dr. Ábrahám György tanszékvezető egyetemi tanár

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.; Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 427

Tel.: +36-62-545-189; Fax: +36-62-545-185; E-mail: [office.in1st@med.u-szeged.hu](mailto:office.in1st@med.u-szeged.hu)

**BELEEGYZŐ NYILATKOZAT A VÉGBÉL  
ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATÁHOZ**

**Beteg neve:** ..... **Szül.:** .....

**TAJ szám:** .....

Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján orvosa EUH (endoszkópos ultrahang) elvégzését javasolja. A vizsgálat elmagyarázását, illetve a vizsgálat kockázatának, lehetséges szövődményeinek említését követően kérjük, hogy beleegyezése jeléül írja alá az alábbi nyilatkozatot.

Az EUH egy biztonságos vizsgálat, mely lehetővé teszi a végbél falának és a környező szöveteknek (prostata, húgyhólyag, méh, kismedence) ultrahanggal történő nagy felbontású ábrázolását és ez által hasznos információkkal egészíti ki a hasi ultrahang, CT, MRI vizsgálatok eredményét. A vizsgálat során a végbéltükrözésnél használatos endoszkópot (merev cső, melynek végén fényforrás, videokamera és ultrahangfej van) vezetünk a végbélnyíláson keresztül a végbél alsó részébe.

Csak az egészen tiszta bél vizsgálható, így a megfelelő előkészítés elengedhetetlen feltétele a sikeres vizsgálatnak. A vizsgálat előtt 3 nappal csak pépes ételt és sok folyadékot fogyasszon. A vizsgálat előtti napon, már csak folyadékot igyon, legalább 3 litert és délután az orvos által javasolt hashajtót kell bevennie. A vizsgálat előtt folyadékot fogyaszthat.

A végbélnyílás lidocainnal történő érzéstelenítését követően vezetjük fel az endoszkópot a kívánt magasságig a végbélbe. A vizsgálat közben vitális paramétereit (szívfrekvencia, oxigénszaturáció) monitorozzuk. A vizsgálat 5-10 percre tart. Hosszabb ideig tartó beavatkozás esetén, vagy kérésére intravénás injekcióval felületesen elaltatjuk (annyira éber marad, hogy kooperálni tudjon) és fájdalomcsillapítót adunk, hogy segítsünk Önt az ellazulásban és minimalizáljuk a vizsgálat okozta kellemetlenséget. A vizsgálatot követően ehetsz. Ha altatót kapott, akkor vezetnie aznap nem tanácsos; hozzon hozzátartozót magával, hogy hazakísérhesse. Ha a vizsgálat után vérzés, láz, vagy hasi fájdalom jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz.

A vizsgálat során nagyon ritkán szövődmények léphetnek fel, úgy, mint a bélfal kilyukadása és vérzés, melyek gyakorisága megegyezik a rutin végbéltükrözés során fellépő szövődmények gyakoriságával. Az altatáshoz használt injekció allergiás reakciót okozhat, mely rendszerint enyhe lefolyású és általában csak arra hajlamos egyéneken alakul ki.

Kérjük, informáljon, ha allergiás valamelyik gyógyszerre, műbillentyűje van, korábban endocarditisze volt, vérzékenysége, szív, tüdő, vesebetegsége van, véralvadásgátlót (heparin, Syncumar, Warfarin), vagy trombocita aggregáció gátlót (aspirin, clopidogrél, ticlopidin) szed, és ha Ön terhes.

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A vizsgálatmal kapcsolatos kérdéseimre adekvát szóbeli tájékoztatást kaptam. Az EUH vizsgálat elvégzésébe beleegyezem.

Szeged, .....

.....  
beteg aláírása

.....  
orvos aláírása

.....  
asszisztens aláírása